

# Optiderm® Creme

[Almirall Hermal GmbH](#)

- [Medikament](#)
- [Fachinformation](#)
- [Identa](#)

## Medikament

Beipackzettel:

[Beipackzettel Optiderm® Creme](#)

### 1 g Creme

Darreichungsform:

Creme

Wirkstoff:

[Harnstoff \(50 mg\)](#), [Polidocanol \(30 mg\)](#)

Sonstige Bestandteile:

[Wasser, gereinigtes](#), [Octyldodecanol](#), [Poly\(methyl/phenylsiloxan\)](#), [Stearinsäure](#), [Dimeticon](#), [Glycerol 85%](#), [Paraffin, dickflüssiges](#), [Cetylpalmitat](#), [Polysorbat 40](#), [Carbomer 940](#), [Benzylalkohol](#), [Trometamol](#)

ATC-Code:

[D02AE51 Harnstoff, Kombinationen](#)

ICD-10:

ICD-10 Informationen nur für [eingeloggte](#) Nutzer.

## Packungen und Preise

PZN, AVP, Festbetrag, Zuzahlung und Preisvergleich nur für [eingeloggte](#) Fachkreise.

### Optiderm® 50 g Creme N1

Creme | 50 g

### Optiderm® 100 g Creme

Creme | 100 g

### Optiderm® 200g Creme (Spender)

Creme | 200 g

### Optiderm® 500g Creme (Spender) N3

Creme | 500 g

## Basisinformation

[Zusammensetzung](#)

100g Creme enthält: Harnstoff 5,0g; Macrogollaurylether 6.5 (Ph. Eur.) (Polidocanol) 3,0g.  
*Hilfsst.:* ger. Wasser; Octyldodecanol (Ph. Eur.); Poly(methyl, phenylsiloxan); Stearinsäure 25; Dimeticon; Glycerol 85%, Dickfl. Paraffin, Hexadecylpalmitat, Polysorbat 40; Carbomer 940, Benzylalkohol; Trometamol.

## Anwendung

Zur Feuchtigkeitsregulierung der Hornschicht, Fettung und Juckreizstillung als unterstützende Behandlung bei Hauterkrank. mit trockener u./od. juckender Haut wie z.B. atopisches Ekzem (Neurodermitis), Exsikkationsekzem (Austrocknungsschäden durch Waschmittel etc.) sowie zur Weiter- und Nachbehandl. der genannten Hauterkrank.

## Gegenanzeigen

Akute Erythrodermie, akut entzündl., nässende und inf. Hautprozesse.

## Stillzeit

Optiderm Lotion sollte während der Stillzeit nicht im Brustbereich angewendet werden, um einen Kontakt mit den Schleimhäuten des Säuglings bzw. eine perorale Aufnahme durch den Säugling zu vermeiden.

## Nebenwirkungen

Gelegentl. Brennen auf der Haut, Erytheme, Pruritus, Pustelbildung am Auftragsort. Nicht bekannt: Kontaktdermatitis, Urtikaria, Hautausschlag, pustulöser Hautausschlag.

## Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung

Nicht m. Augen und Schleimhäuten in Berührung bringen.

## Hinweis

Die gleichzeitige Anwendung von harnstoffhaltigen Topika wie Optiderm zusammen mit anderen äußerlich anzuwendenden Arzneimitteln (z.B. Kortikoide, Dithranol, 5-Fluorouracil) kann deren Penetration/Resorption durch die Haut verstärken. Bei gleichzeitiger Anw. von Latexprodukten (z.B. Kondome, Diaphragmen) kann es zu einer Beeinträchtigung der Sicherheit dieser Produkte kommen.

## Dosierung

2x tgl. gleichm. dünn auftragen. Anwendungsdauer: durchschnittl. 3 Wo.